

ZDRAVSTVENO VZGOJNI POSVET IN OCENA STANJA VEN

Datum: _____

Ocena venskega ožilja

vene so popolnoma nevidne in niso otipljive	vene so mehke, polne
vene so vidne in niso otipljive	vene so trde, nitaste
vene so komaj vidne in otipljive	vene so vozličaste
vene so vidne in otipljive	vene so tanke, krhke
vene so jasno vidne in otipljive	koža je tanka, krhka

Ocena po lestvici DIVA (Difficult IntraVenous Access)

DEJAVNIK	TOČKA
Ali obstaja znana zgodovina težkega intravenoznega dostopa?	1
Ali pričakujete neuspešno prvo uvajanje kanile ali težaven iv dostop?	1
Ali obstaja nezmožnost tipati vene na roki?	1
Ali obstaja nezmožnost videti vene na roki?	1
Ali je največja tipna vena manj kot 3 mm?	1
Seštevek točk	

Aditivna lestvica DIVA je predstavljena kot aditivni sistem ocenjevanja za izračun predvidenega tveganja za posameznega bolnika. Glede na obstoječe dejavnike tveganja, se poda priporočena ocena tveganja intravenskega dostopa. **Točka (ocena) se obkroži, ko na vprašanje odgovorite z »da«.**

DIVA profil tveganja (glede na seštevek točk)

	NIZKO TVEGANJE	ZMerno TVEGANJE	VISOKO TVEGANJE
Seštevek točk	1	2 – 3	4 – 5
Predvidena stopnja nevarnosti	94%	63%	6%

Dipl. m.s./Dipl. znanstvenik ocenili vensko ožilje:

Priimek, ime	Podpis

Lečeči zdravnik _____ obveščen o stanju ven bolnika/ce: DA NE

Priporočilo za vstavev: VAP PICC

Podpis zdravnika: _____

Aplikacija vezikantov	NE	DA → VAP/PICC
Dopolnilna terapija	PICC	6 – 12 mesecev
Pričakovano dolgotrajno zdravljenje	VAP	Več kot 12 mesecev

Seznanitev bolnika o **TEŽJEM PERIFERNEM VENSKEM DOSTOPU:**

Zdravila za zdravljenje raka so visoko učinkovita zdravila, ki se odmerjajo v obliki tablet, kapsul ali preko infuzije. Posamezna zdravila se razlikujejo v njihovem načinu delovanja in pri njihovih stranskih učinkih. Glede na bolezensko situacijo se uporabi eno zdravilo ali (pogosteje) kombinacija različnih zdravil, ki se v svojem delovanju dopolnjujejo. V skupino substanc, ki se najpogosteje uporabljajo, spadajo predvsem alkilanci, derivati antraciklinov, antimetaboliti, vinca alkaloidi, taksani, zaviralci topoizomerase in derivati platine.

Vedeti morate: Načrt zdravljenja je prilagojen točno vam. Ta načrt se lahko razlikuje od zdravljenja drugih pacientov z isto vrsto obolenja. Po drugi strani pa ni nujno, da imajo pacienti, ki dobivajo enaka zdravila enako obolenje.

Pri zdravljenju se kljub vsej skrbnosti ne moremo izogniti določenemu tveganju hujših zapletov in občasnim trajnimi prizadetostmi. Z vašim sodelovanjem lahko ta tveganja ohranimo na kar se da nizkem nivoju.

Neželeni učinek: **PARAVAZACIJA (EKSTRAVAZACIJA):**

- Nekatera zdravila lahko povzročijo vnetna draženja ožilja in lahko obstoječa obolenja stopnjujejo.
- Nekatera zdravila lahko – če pri apliciranju vdrejo v tkivo zraven žile (paravazat / ekstrapazat) – povzročijo hude poškodbe tkiva, vse do odmrtnosti tkiva (nekroze) v okolici vbodne mesto.

Pacient/ka (ime, priimek, datum rojstva): _____,

s podpisom potrjujem, da me je zdravstveno osebje seznanilo, da zdravilo za zdravljenje raka, ki lahko povzroči različne posledice na ožilju.

Datum: _____

Podpis: _____

Pacient v zdravstveno vzgojni postojalnici prejme priloge:

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

Posvetovanje opravil/a: _____

Pacient/ka (ime, priimek, datum rojstva): _____,

s podpisom potrjujem, da sem s strani zdravstvenega osebja seznanjen/a z možnimi neželenimi učinki zdravljenja z zdravili za zdravljenje raka in so mi bile izročene označene priloge.

Datum: _____

Podpis: _____